

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis diaria:

Le han prescrito una dosis de Erlotinib (TARCEVA®) de _____ mg 1 vez al día.

Normas para la correcta administración:

Este medicamento **no se debe tomar junto con alimentos**, por ello debe tomar el medicamento al menos, una hora antes o dos después de haber comido.

¿Cuándo tomar la medicación?

	Desayuno	Comida	Cena	¿Como administrarlo?
	1 hora antes o 2 horas después  	1 hora antes o 2 horas después  	1 hora antes o 2 horas después  	
Tarceva 150 mg 				En ayunas

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Observaciones:

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Erlotinib TARCEVA®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

ERLOTINIB (TARCEVA®)

¿Qué es y para que se utiliza?

- ✳ Erlotinib es un medicamento indicado en el tratamiento de cáncer de pulmón no microcítico.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✳ Su médico le indicará la dosis adecuada según su patología. La dosis habitual es 150 mg al día.
- ✳ Erlotinib se administra una vez al día. Debe tomarlo siempre a la misma hora.
- ✳ El tratamiento deben tomarse **en ayunas**, es decir, una hora antes o dos horas después de las comidas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✳ Alteraciones gastrointestinales: especialmente diarrea aunque también se pueden producir vómitos, dolor abdominal, llagas en la garganta y/o en la boca. Molestias estomacales.
- ✳ Alteraciones en la piel: Rash cutáneo (erupciones en la piel) y/o sequedad en la piel.
- ✳ Alteraciones respiratorias: Tos y sensación de fatiga o falta de aire.
- ✳ Alteraciones oculares: Irritación ocular
- ✳ Alteraciones generales: Cansancio, fiebre y escalofríos, pérdida de apetito

Precauciones

- ✳ En caso de presentar alguno de los síntomas que se detallan a continuación, deberá ponerse en contacto con su médico o acudir a un centro sanitario:
 - ✳ **Diarrea**: si incrementa en más de 4 las deposiciones al día con respecto a sus deposiciones normales.
 - ✳ **Fiebre**: si tiene una temperatura mayor a 38º C.
 - ✳ Tos persistente de inicio repentino sobre todo si se acompaña de fatiga.
 - ✳ Picor, ojos o piel amarillenta, orina oscura y dolor o malestar en la parte superior derecha del estómago.
- ✳ No se recomienda el uso de “protectores gástricos”(omeprazol o ranitidina) durante el tratamiento con Erlotinib. Si fuese necesario, tómelo al menos 4 horas antes o 2 horas después de la dosis Erlotinib.
- ✳ Advierta a su médico si está tomando fármacos anticoagulantes (como Sintrom®).

- ✳ El tabaco disminuye la eficacia de Erlotinib, por lo que se recomienda dejar de fumar.
- ✳ Evite la exposición al sol. En caso contrario, se recomienda el uso de cremas hidratantes y con protección solar.
- ✳ **Embarazo**: es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se deberá utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento y al menos dos semanas después de la suspensión del mismo.
- ✳ **Lactancia**: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.
- ✳ Este medicamento contiene lactosa.
- ✳ No lo tome con zumo de pomelo.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✳ Si olvida tomar Erlotinib a su hora habitual, tome la medicación tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar el tratamiento
- ✳ **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido.**

¿Cómo se debe conservar?

- ✳ Conservar a temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC).

Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO