

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis diaria: _

Le han prescrito una dosis de Lenalidomida (REVLIMID®) de ___mg al día.

Normas para la correcta administración:

El tratamiento debe tomarse con o sin alimentos, pero en caso de molestias gástricas tómelo con alimentos. Deben tragarse enteras (no abrir ni masticar), preferiblemente con agua, y a la misma hora cada día.

¿Cuándo tomar la medicación?

Desayuno	Comida	Cena	¿Cómo administrarlo?
			Con o sin alimentos

REVLIMID[®] 10 mg
REV 10 mg

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Lenalidomida REVLIMID[®]

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

¿Qué es y para que se utiliza?

- ✖ Revlimid® está indicado para el tratamiento de distintas neoplasias.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✖ Su médico le indicará la dosis adecuada según su patología.
- ✖ Las cápsulas pueden tomarse con o sin alimentos, pero en caso de molestias gástricas tómelo con alimentos.
- ✖ Deben tragarse enteras (no abrir ni masticar), preferiblemente con agua, y a la misma hora cada día.
- ✖ Evite el contacto con la piel, y lávese las manos antes y después de cada toma.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Alteraciones gastrointestinales: (diarrea, estreñimiento, náuseas...), cansancio, debilidad muscular y calambres

Alteraciones hematológicas: (disminución de glóbulos rojos y glóbulos blancos),

Otros: alteraciones del sueño, visión borrosa, erupciones cutáneas y riesgo aumentado de infecciones.

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Precauciones

- ✖ Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Lenalidomida. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.
- ✖ Las mujeres en edad fértil deben usar un método anticonceptivo eficaz 4 semanas antes, durante y hasta 4 semanas después del tratamiento. Si se queda embarazada, informe inmediatamente a su médico.
- ✖ Los varones que tomen Lenalidomida también deben usar métodos anticonceptivos hasta una semana después del final del tratamiento.

- ✖ Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento.
- ✖ No se debe donar sangre durante el tratamiento ni en el plazo de 1 semana después de la interrupción del tratamiento.
- ✖ Se recomienda precaución al conducir o utilizar máquinas.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✖ Si ha olvidado una dosis y han transcurrido menos de 12 horas desde el olvido puede tomarla. Si han transcurrido más de 12 horas debe esperar hasta la próxima toma.
- ✖ Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cómo se debe conservar?

- ✖ Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).

Identificación

REVLIMID® 5 mg: Cápsulas blancas, marcadas con “REV 5 mg”.

REVLIMID® 10 mg: Cápsulas azul-verde/amarillo, marcadas con “REV 10 mg”.

REVLIMID® 15 mg: Cápsulas azul/blanco, marcadas con “REV 15 mg”.

REVLIMID® 25 mg: Cápsulas blancas, marcadas con “REV 25 mg”

Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO