

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis diaria:

Le han prescrito Sunitinib (SUTENT®) ___mg al día durante ___días. (Ver informe clínico).

Normas para la correcta administración:

Las cápsulas se deben tomar con agua, con o sin alimentos.

¿Cuándo tomar la medicación?

Al levantarse	Desayuno	Comida	Merienda	Cena	Al Acostarse	¿Como administrarlo?
						Con o sin alimentos

Sutent 50 mg



Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Sunitinib SUTENT®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

SUNITINIB (SUTENT®)

¿Qué es y para que se utiliza?

- ✖ Es un medicamento indicado en el tratamiento de distintas enfermedades oncológicas.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✖ Su médico le indicará la dosis adecuada según su patología.
- ✖ Sunitinib se administra una vez al día.
- ✖ Las cápsulas deben tomarse enteras con un poco de agua. **Pueden tomarse con o sin alimentos.**

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✖ Alteraciones gastrointestinales: especialmente diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, llagas en la garganta y/o en la boca. Pérdida de apetito.
- ✖ Alteraciones en la piel: Se puede producir una despigmentación en la piel y el cabello. También se puede producir el síndrome de mano-pie (enrojecimiento, dolor, picor o ampollas en zona de manos y pies)
- ✖ Fatiga o cansancio intenso, dolor de cabeza.
- ✖ Alteraciones en el sabor de los alimentos.
- ✖ Aumento de la presión arterial: debe controlar la tensión arterial.
- ✖ Sangrados.
- ✖ Problemas de tiroides.
- ✖ Edemas

Precauciones

- ✖ En caso de presentar alguno de los síntomas que se detallan a continuación, deberá ponerse en contacto con su médico o acudir a un centro sanitario:
 - **Diarrea**: si incrementa en más de 4 las deposiciones al día con respecto a sus deposiciones normales.
 - **Fiebre**: si tiene una temperatura mayor a 38º C.
 - **Picor, ojos o piel amarillenta, orina oscura y dolor o malestar en la parte superior derecha del estómago.**
- Advierta a su médico si tiene previsto realizarse algún tratamiento dental, en especial si ha sido tratado con bifosfonatos por vía intravenosa.

- ✖ **Embarazo**: es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se deberá utilizar medidas anticonceptivas eficaces.
- ✖ **Lactancia**: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✖ Si olvida tomar Sunitinib a su hora habitual, tome la medicación tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar el tratamiento
- ✖ **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido**

¿Cómo se debe conservar?

- ✖ Conservar a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C). Proteger del calor, la humedad y la luz.
- ✖

Identificación



Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con el Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO