

## +Información al paciente citado en la Unidad del Dolor para realización de un procedimiento invasivo+

**Alcance:** Pacientes que van a someterse a un procedimiento invasivo en alguna de las Unidades del Dolor de HM Hospitales.

### Instrucciones previas

- Su médico le indicará si debe estar en ayunas. En ese caso, las ayunas serán de 6 horas, pudiendo tomar agua hasta 2 horas antes de la cita.
- No precisa rasurar la zona a tratar.
- Debe de venir acompañado y en ningún caso podrá conducir en las horas posteriores.
- Debe informar de sus **alergias** antes de la realización de la técnica.
- En caso de tomar **anticoagulantes para la sangre** (Plavix/Clopidogrel, Coumadin/Warfarina, Pradaxa/Dabigatrán, Rivaroxaban/Xarelto, Apixaban/Eliquis, Aspirina/Adiro/Ácido acetilsalicílico) es posible que tenga que dejar de tomarlos 7 días antes de la intervención. Será su médico quien lo indique.
- En caso de tomar **medicamentos para la diabetes**, asegúrese de hablar con su médico antes de la intervención. Alguna medicación usada en quirófano podría afectar a su nivel de glucemia.

### Debe acudir a la Recepción Principal

- Deberá venir al hospital con la **autorización de la sociedad** y el **consentimiento informado firmado** que se le entregó en la consulta, desde allí le acompañaran a la Unidad del Dolor.

### Instrucciones posteriores

- Podría precisar reposo las horas inmediatamente posteriores al procedimiento (2-3 horas).
- Por nuestra parte no precisa baja médica.
- Si nota dolor en la zona de punción, aconsejamos tomar algún tipo de antiinflamatorio común las 24-48 horas posteriores.
- El apósito que se le ha colocado en la zona de la punción, se puede retirar cuando llegue a su domicilio.
- Ante cualquier evento adverso (fiebre, escalofríos, dolor severo, debilidad en extremidades, relajación de esfínteres...) acuda a un Servicio de Urgencias o póngase en contacto con la Unidad de Dolor.